

Recomendaciones de Bioseguridad por distintas Áreas Operativas

Elementos de Protección Personal (EPP)

De acuerdo a las recomendaciones de la OMS y los Protocolos Nacionales y Provinciales, el Ministerio de Salud establece las normativas en relación al Equipo de Protección Personal (EPP), para ser utilizado por los integrantes de los Servicios de Salud, durante la contingencia COVID-19.

Las "Precauciones Estándares" están diseñadas para reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes de infecciones nosocomiales reconocidas o no. Dentro de estas precauciones se encuentran las precauciones de contacto y de transmisión por gota, para prevenir la infección y contaminación del personal de los Servicios Sanitarios.

Estas medidas comprenden:

- higiene de manos,
- higiene respiratoria,
- uso de equipos de protección personal según evaluación de riesgo,
- descarte seguro de materiales corto punzantes,
- manejo adecuado del ambiente y de los residuos patológicos hospitalarios,
- esterilización y desinfección de dispositivos médicos y hospitalarios,
- limpieza del entorno hospitalario.

Estas recomendaciones deben ser aplicadas para **TODO** paciente que requiera asistencia en cualquier centro de salud de la Provincia de Córdoba y debe ser empleada por **TODOS** los trabajadores de la salud y en **TODOS** los entornos sanitarios ya que son medidas generales encaminadas a minimizar la diseminación de la infección y evitar el contacto directo con sangre, fluidos corporales, secreciones o piel no intacta de los pacientes, como así también, evitar la transmisión hacia el personal asistencial.

A Todo paciente que acude a cualquier establecimiento de salud con sintomatología febril respiratoria se debe indicar barrera de protección al paciente: BARBIJO QUIRURGICO

Elementos de protección personal según las distintas áreas operativas

Kit#1: Barbijo, bata y guantes.

Kit#2: Barbijo, bata, guantes y antiparras o escafandra.

Kit#3: Barbijo N95 o similar, bata, guantes, antiparras y escafandra.

Kit#3 UTI: Barbijo N95 o similar, bata + ambo o mameluco, guantes, y escafandra.

Administrativos SIN atención al público

1. No utilizar barbijo.
2. Distanciamiento social (más de 2 metros).
3. Lavado frecuente de manos, con agua y jabón por 60" o con alcohol en gel por 40".
4. Limpieza del área de trabajo (teclado, mesada, teléfono) en forma frecuente.

Administrativos CON atención al público (secretarios) que hagan Triage o no.

1. Utilizar kit#1
2. Distanciamiento social (más de 2 metros).
3. Lavado frecuente de manos, con agua y jabón por 60" o con alcohol en gel por 40".
4. Limpieza del área de trabajo (teclado, mesada, teléfono) en forma frecuente.

Médicos y Enfermeros



CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIAS



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
CÓRDOBA



ENTRE
TODOS

1. Lavado de manos antes y después de atender pacientes en cualquier área, con agua y jabón por 60" o con alcohol en gel por 40".
2. Pacientes **SIN** Indicación aislamiento: Utilizar kit#1.
3. Pacientes **CON** Indicación aislamiento utilizar KIT#3. En el caso de pasar a fase de mitigación, se usará Kit#3 UTI para atender cualquier paciente.

Farmacéuticos

1. Dentro de la farmacia kit#1
2. Asistencia a sectores **SIN** aislamiento Kit#1
3. Los Farmacéuticos **NO** deben de ningún modo ingresar a un Área de Aislamiento.

Personal de Central de Esterilización

1. Kit#3.

Paramédicos y Chofer

1. Lavado de manos antes y después de atender pacientes en cualquier área, con agua y jabón por 60" o con alcohol en gel por 40".
2. Atención de Pacientes **SIN** indicación de aislamiento: Utilizar kit#1.
3. Atención de pacientes **CON** indicación de aislamiento utilizar KIT#2. En el caso de pasar a fase de mitigación, se usará Kit#3 para atender cualquier paciente.



Médico, Enfermería y Kinesiología que asiste directamente en procedimientos de intubación, manejo de vía aérea y en toma de muestras.

1. Lavado de manos antes de ingresar a la habitación, con agua y jabón por 60" o con alcohol en gel por 40".
2. Utilizar KIT#3 UTI.

Personal de Rayos

1. Lavado de manos antes de ingresar a CUALQUIER habitación o en la atención en el Servicio, con agua y jabón por 60" o con alcohol en gel por 40".
2. Atención de pacientes **SIN** aislados: Utilizar kit#1.
3. Atención de pacientes **CON** aislamiento: Utilizar KIT#3
4. Lavado de manos al finalizar el procedimiento, con agua y jabón por 60" o con alcohol en gel por 40".

Personal de Laboratorio

Lavado de manos antes y después de ingresar a CUALQUIER habitación o en Guardia, con agua y jabón por 60" o con alcohol en gel por 40".

1. Dentro del laboratorio kit#1
3. Atención de pacientes **SIN** indicación de aislamiento: Utilizar kit#1.
4. Atención de Pacientes **CON** indicación de aislamiento: Utilizar KIT#3
5. Lavado de manos al finalizar el procedimiento, con agua y jabón por 60" o con alcohol en gel por 40".

Camilleros



CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIAS



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
CÓRDOBA



ENTRE
TODOS

1. Lavado de manos antes y después de ingresar a CUALQUIER habitación, con agua y jabón por 60" o con alcohol en gel por 40".
2. Atención de pacientes **SIN** indicación de aislamiento: Utilizar kit#1.
3. Atención de Pacientes **CON** indicación de aislamiento: Utilizar KIT#2
4. En zonas de Riesgo de Aerosolización (UTI, UCO, etc): Utilizar KIT#3
5. Descartar el EPP dentro de la habitación, tras regresar al paciente a la misma.

Personal que maneja el transporte de la ropa ya Embolsada

1. Lavado de manos antes y después de ingresar a CUALQUIER habitación, con agua y jabón por 60" o con alcohol en gel por 40".
2. Pacientes **SIN** indicación de aislamiento: Utilizar kit#1.
3. Pacientes **CON** indicación de aislamiento:
 1. Utilizar KIT # 2
 2. Cuando retire la ropa sucia debe estar ya dentro de una bolsa de plástico cerrada y precintada.

Personal de Limpieza

1. Lavado de manos antes de ingresar a CUALQUIER habitación, con agua y jabón por 60" o con alcohol en gel por 40".
2. Habitaciones **SIN** indicación de aislamiento: Utilizar kit#1.
3. Habitaciones **CON** indicación de aislamiento. Utilizar KIT # 2. Agregar botas impermeables y guantes de goma.
4. En zonas de Riesgo de Aerosolización (UTI, UCO, etc): Utilizar KIT#3

Camareras

1. Lavado de manos antes de ingresar a CUALQUIER habitación, con agua y jabón por 60" o con alcohol en gel por 40".
2. Habitaciones **SIN** aislamiento: Utilizar kit#1.
3. Habitaciones **CON** aislamiento: Utilizar KIT #1.

Evitar contacto con el paciente y su entorno.

Limpieza del área de trabajo (mesa) en forma frecuente.

Servicio de Cocina

1. Utilizar la indumentaria habitual en cocina.
2. Distanciamiento social (más de 2 metros).
3. Lavado frecuente de manos, con agua y jabón por 60" o con alcohol en gel por 40".
4. Limpieza del área de trabajo (mesada, teléfono) en forma frecuente.
5. Evitar circular por áreas de atención a pacientes.


Servicio de Mantenimiento

1. No utilizar barbijo.
2. Distanciamiento social (más de 2 metros).
3. Lavado frecuente de manos, con agua y jabón por 60" o con alcohol en gel por 40".
4. Limpieza del área de trabajo (teclado, mesada, teléfono) en forma frecuente.
5. Si ingresa a habitación de paciente aislado, comunicarse con enfermera del área para provisión de EPP KIT #1 (Barbijo, bata, guantes).

6. En zonas de Riesgo de Aerosolización (UTI, UCO, etc): Utilizar KIT#3.

Pasos para ponerse el equipo de protección personal (EPP)

- 1 Quítese todos los efectos personales (joyas, reloj, teléfono móvil, bolígrafos, etc.).
- 2 Haga una inspección visual para cerciorarse de que todos los componentes del EPP sean del tamaño correcto y de una calidad apropiada.
- 3 Higienícese las manos.



- 4 Póngase una bata desechable
- 5 Póngase Guantes.
- 6 Póngase la mascarilla facial.
- 7 Póngase una escafandra protectora o gafas protectoras.

Secuencia de retiro de EPP

El orden de retiro adecuado debe ser la siguiente:

1. Retirar la bata y descartarla en bolsa roja. (En lo posible retirar en simultaneo la bata y los guantes).
2. Retirar guantes y descartar en bolsa roja.
3. Higiene de manos.
4. Retirar antiparras o escafandra para poder limpiarla adecuadamente.
5. Retirar el barbijo y proceder según tipo de elemento utilizado.
6. Higiene de manos.

E.P.P. para el personal que ejecute tareas de apoyo a la comunidad:

COVID-19 | Coronavirus

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Para el personal que ejecute tareas de Apoyo a la Comunidad

EPP a utilizar por personal que opera en contacto con infectados

Cofia
Protector facial / antiparras
Barbijo tipo 2 / N95
Guantes de látex
Camisolín hidrorrepelente
Botas quirúrgicas

Pasos de colocación del EPP

<p>1 Quitar los efectos personales (reloj, anillos, pulseras, etc).</p>	<p>2 Lavarse las manos con jabón por 60 segundos.</p>	<p>3 Colocarse el camisolín, si se dispone.</p>	<p>4 Colocarse el barbijo N95 y luego el barbijo tipo 2.</p>
<p>5 Colocarse las antiparras.</p>	<p>6 Colocarse la cofia, si se dispone.</p>	<p>7 Colocarse el protector facial (si es necesario).</p>	<p>8 Colocarse los guantes cubriendo la empuñadura del camisolín.</p>

Pasos para retirar el EPP

<p>1 Quitar el protector facial.</p>	<p>2 Quitarse el camisolín junto con los guantes y descartarlos en un contenedor con bolsa roja.</p>	<p>3 Si se utilizó mameluco de protección reutilizable, colocarlo en el contenedor para desinfectar.</p>	<p>4 Lavarse las manos con agua y jabón por 60 segundos o con alcohol en gel.</p>
<p>5 Sacarse las antiparras por la parte posterior y depositarlas en el contenedor para desinfectar.</p>	<p>6 Sacarse el barbijo común de atrás hacia adelante y deshechar en una bolsa roja.</p>	<p>7 Retirar el barbijo N95 y guardarlo en una bolsa de papel para su reutilización.</p>	<p>8 Lavarse nuevamente las manos con agua y jabón por 60 segundos o con alcohol en gel.</p>

COVID-19 | Coronavirus

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Para el personal que ejecute tareas de Apoyo a la Comunidad



Aspectos particulares importantes

